

- ▶ BIKTARVY bör inte tas samtidigt med antacida eller kosttillskott som innehåller magnesium och/eller aluminium p.g.a. den förväntade väsentliga minskningen av biktgravirexponering.
- ▶ BIKTARVY bör administreras minst 2 timmar före, eller tillsammans med mat 2 timmar efter syraneutraliserande medel eller kosttillskott som innehåller magnesium och/eller aluminium.
- ▶ BIKTARVY bör administreras minst 2 timmar innan järntillskott, eller så kan du ta dem tillsammans med mat.

Graviditet och amning

- ▶ Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.
- ▶ Tala genast om för läkare om du blir gravid och fråga om möjliga fördelar eller risker med din antiretrovirala behandling för dig och ditt barn.
- ▶ Syraneutraliserande medel innehållande aluminium och/eller magnesium: under din graviditet ska du ta BIKTARVY minst 2 timmar före eller 6 timmar efter intag av syraneutraliserande medel, läkemedel eller kosttillskott som innehåller aluminium och/eller magnesium.
- ▶ Kosttillskott eller läkemedel som innehåller kalcium och/eller järn: under din graviditet ska du ta BIKTARVY minst 2 timmar före eller 6 timmar efter intag av kosttillskott eller läkemedel som innehåller kalcium och/eller järn. Alternativt kan du ta dem när som helst tillsammans med mat.

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan BIKTARVY orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. De vanligaste biverkningarna är huvudvärk, diarré och illamående.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Läs bipacksedeln för mer information om eventuella biverkningar och hur de ska rapporteras. ***Sluta aldrig att ta ditt läkemedel utan att du har pratat med din läkare först!***

Kontakta: _____

Avdelningens telefonnummer: _____

Guide till patienter som påbörjar behandling med BIKTARVY®

Läs noga igenom bipacksedeln
innan du börjar ta BIKTARVY.



GILEAD

Gilead Sciences Sweden AB
Hemvärnsgatan 9, SE-171 54 Solna
Phone: + 46 (0)8-505 718 00

Vad är BIKTARVY® för typ av läkemedel?

BIKTARVY är ett läkemedel för behandling av hiv-1 hos vuxna och barn i åldern 2 år och äldre som väger minst 14 kg. BIKTARVY består av tre substanser i en tablett som motverkar hiv-viruset i kroppen.

BIKTARVY är en liten tablett som tas en gång om dagen, med eller utan mat (inga matrestriktioner).

En tablett innehåller:



Vikten av att ta sitt läkemedel

- ▶ Att ta sitt läkemedel regelbundet är viktigt för att hålla kvar virusnivåerna på en oupptäckbar nivå, samt motverka risken för att man utvecklar resistens mot läkemedlet, vilket kan leda till att det slutar fungera och virusnivåerna stiger igen.
- ▶ Försök att skapa rutiner kring hur du tar din medicin. Till exempel ladda ner en app som påminner dig om att ta din tablett eller lägg in en påminnelse i din mobil.



En tablett en gång om dagen



Kan tas när som helst på dagen



Kan tas med eller utan mat

Om du har glömt att ta BIKTARVY

Det är viktigt att du inte missar någon dos av BIKTARVY. Om du missar en dos:

- ▶ **Om du kommer ihåg det inom 18 timmar** efter den tidpunkt då du brukar ta BIKTARVY, måste du ta tablettens så snart som möjligt. Ta sedan nästa dos som vanligt.
- ▶ **Om du kommer ihåg det efter 18 timmar eller mer** efter den tidpunkt då du brukar ta BIKTARVY ska du inte ta den missade dosen. Vänta och ta nästa dos vid den vanliga tidpunkten.
- ▶ **Om du kräks** inom mindre än 1 timme efter en dos BIKTARVY, ta en ny tablett. Om du kräks mer än 1 timme efter att ha tagit BIKTARVY, behöver du inte ta en ny tablett förrän nästa normalt schemalagda dos.

Läkemedel som aldrig får tas med BIKTARVY:

- ▶ **rifampicin**, används för att behandla vissa bakterieinfektioner såsom tuberkulos.
- ▶ **Johannesört** (*Hypericum perforatum*), ett växtbaserat läkemedel som används mot lätt nedstämdhet och ångest.